

食道癌 レジメン一覧

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与日 | 1クール 日数 | 標準クール数 | 備考 |
|---------------------------|--|-------------------------------|------------|---------------|---------------------------|
| FOLFOX | レボホリナート オキサリプラチン bolus5-FU 46hr5-FU | day1 day1 day1 day1— | 14日 | | |
| FOLFOX+RT | レボホリナート オキサリプラチン bolus5-FU 46hr5-FU | day1 day1 day1 day1— | 14日 | 6 | |
| FP | シスプラチン 5-FU | day1 day1—5 | 28日 | 6 | アプレピタント併用day1-3 |
| FP+RT | シスプラチン 5-FU | day1 day1—4 | 28日 | 2-3 | アプレピタント併用day1-3 |
| 術前FP | シスプラチン 5-FU | day1 day1—5 | 28日 | 2 | アプレピタント併用day1-3 |
| 術前FP+RT | シスプラチン 5-FU | day1, 8 day1—5, 8—12 | 28-35日 | 2 | アプレピタント併用 day1-3, 8-10 |
| FP+ニボルマブ【2週毎】 | ニボルマブ シスプラチン 5-FU | day1, 15 day1 day1—5 | 28日 | ニボルマブは 2年間 | アプレピタント併用day1-3 |
| FP+ニボルマブ【2週毎】ホップ | ニボルマブ シスプラチン 120hr5-FU | day1, 15 day1 day1— | 28日 | ニボルマブは 2年間 | アプレピタント併用day1-3 |
| FP+ニボルマブ【4週毎】 | ニボルマブ シスプラチン 5-FU | day1 day1 day1—5 | 28日 | ニボルマブは 2年間 | アプレピタント併用day1-3 |
| FP+ニボルマブ【4週毎】ホップ | ニボルマブ シスプラチン 120hr5-FU | day1 day1 day1— | 28日 | ニボルマブは 2年間 | アプレピタント併用day1-3 |
| FP+ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ シスプラチン 5-FU | day1 day1 day1—5 | 21日 | 6 | アプレピタント併用day1-3 |
| 5-FU+ペムブロリズマブ 維持療法 | ペムブロリズマブ 5-FU | day1 day1—5 | 21日 | | |
| 5-FU+ペムブロリズマブ 維持療法 ホップ | ペムブロリズマブ 120hr5-FU | day1 day1— | 21日 | | |

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与日 | 1クール 日数 | 標準クール数 | 備考 |
|-------------------|------------------|----------------------|------------|--------|----|
| DTX | ドセタキセル | day1 | 21日 | | |
| NDP+DTX | ネダプラチン ドセタキセル | day1 day1 | 14日 | | |
| NDP+5-FU | ネダプラチン 5-FU | day1 day1—5 | 28日 | | |
| ニボルマブ | ニボルマブ | day1 | 14日 | | |
| 術後ニボルマブ2週毎 | ニボルマブ | day1 | 14日 | 最長12ヶ月 | |
| 術後ニボルマブ4週毎 | ニボルマブ | day1 | 28日 | 最長12ヶ月 | |
| ニボルマブ【2週毎】+イピリムマブ | ニボルマブ イピリムマブ | day1, 15, 29 day1 | 42日 | 2年間 | |
| ニボルマブ【3週毎】+イピリムマブ | ニボルマブ イピリムマブ | day1, 22 day1 | 42日 | 2年間 | |

※RT:放射線治療